

## Գեզագարդ



**Ազդող նյութը՝** պրոմետրին 500 գ/լ  
**Փաթեթավորումը՝** 5 լ պոլիէթիլենային տարա  
**Պատրաստուկային ձևը՝** խտացված կախույթ կամ թրջվող փոշի  
**Արտադրող ֆիրման (երկիրը)՝** Սինգենտա (Շվեյցարիա)  
 Գեզագարդը կարտոֆիլի, բանջարեղենի, տեխնիկական և այլ մշակաբույսերի դաշերում միանյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտերի դեմ պայքարի գերազանց հերբիցիդ է

### Հատկությունները

- միանյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտերի վրա արդյունավետ ազդեցություն
- պաշտպանվող մշակաբույսերի լայն շրջանակ
- ցանքաշրջանառությունների դեպքում հաջորդող մշակաբույսերի վրա ազդեցության բացակայություն
- պաշտպանող ազդեցության երկարատևություն:

### Առավելությունները

- ճանաչում վայելող, ժամանակի փորձությունը անցած մոլախոտասպան
- տնտեսական արդյունավետության ապահովում
- գերազանց արդյունք դժվար ոչնչացվող մոլախոտերի դեմ պայքարում
- վեգետացիայի ընթացքում հողի մեջ ամբողջովին քայքայում:  
**Համատեղելիությունը**
- պատրաստուկը համատեղելի է շատ պեստիցիդների հետ, սակայն խորհուրդ է տրվում անցկացնել համատեղելիության նախնական ստուգում  
**Ազդեցության արագությունը**
- մինչծլային փուլում հերբիցիդի օգտագործումը կանխարգելում է մոլախոտերի ծլումը, հետծլային շրջանում մոլախոտերը ոչնչանում են 4-7 օրվա ընթացքում:  
**Ֆիտոտոքսիկությունը**
- բացակայում է ստորև բերված օգտագործման չափաքանակների խստիվ պահպանման դեպքում:

### *Պատրաստուկի օգտագործմանն առաջարկվող չափաքանակներ*

Մշակաբույսի անվանումը	Մոլախոտեր	Պատրաստուկի ծախսի քանակը լ/հա	Աշխատանքային հեղուկի ծախսը լ/հա	Սրսկման ժամկետները	Սպասման ժամկետը (բուժումների առավելագույն քանակը)
Կարտոֆիլ	միանյա երկշաքիլ և հացազգի	2.0-3.5	200-300	սրսկումը կատարել մշակաբույսի նախածլային փուլում	20/1
Սոյա		2.5-3.5			-(-)
Ոլոռ		2.5-3.0			-(-)
Արևածաղիկ		2.0-3.5		միաժամանակ ցանքի ընթացքում կամ ծլելուց առաջ (բերքահավաքից 60 օր առաջ)	-/1
Գազար		1.5-3.0		ցանքից առաջ, մինչծլային փուլում, ծլելուց հետո 2 իսկական տերևի փուլում	40/1
Լոբի		3.0		մշակաբույսի ծլելուց 2-3 օր առաջ կամ 1-2 տերևների առկայության դեպքում	-/1
Կանաչեղեն		2.0-3.0		սրսկումը կատարել մշակաբույսի նախածլային փուլում կամ մշակաբույսի 1-2 իսկական տերև փուլում	28(1)